

Prévalence de la Borréliose Lyme chez les professionnels

Résultats

Objectif principal : Estimer la séroprévalence de la Borréliose de Lyme et de la TBE des professionnels exposés : Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne-Ardenne

5461 sujets convoqués, 3033 répondants (55,5% de participation) 2975 inclusions


Séropositifs Borréliose de Lyme : 14,3%

Alsace 26,9%, Jura 3,3%, Doubs 4,9%, Haute-Saône 7,2%


Zone D'étude : Le Grand Est

Population de l'étude :


SA,ETF, ONCFS, CSP, DDAR



L'analyse multifactorielle des techniques de prévention fait apparaître concernant la Franche Comté une connaissance imparfaite de ces techniques pour les bucherons, les conducteurs d'engins, les exploitants agricoles dans le Doubs et le Jura



Département	convoqués	inclus	Non répondant	participation
Doubs	388	237	121	68,8%
Jura	236	144	90	61,9%
Haute Saône	257	152	104	59,5%
Territoire de B.	47	21	26	44,7%
Total	928	554	341	



Prévention

PENDANT LE TRAVAIL

Les répulsifs doivent être renouvelé toutes les 4 heures

Le Di-éthyl-toluamide est efficace à des concentration sup à 30%

Marque	Présentation	Constituant	Concentration	Laboratoire
DEET 50	spray	DEET	50%	SMI
INSECT ECRAN	Lotion Gel	DEET	50%	Osler
REPEL INSECT	Spray	DEET	50%	Cattier Dislab
MOSKIZOL	Gel	DEET	50%	MOSKIZOL

Porter des vêtements couvrants à manches longues

Pantalon dans les chaussures, gants, casque ou casquette

APRES LE TRAVAIL

inspection cutanée minutieuse et complète

ablation le plus précocément possible de la tique entière



consulter en cas d'apparition d'un erythème migrant



crochet d'extraction



erythème migrant



Marque	Présentation	Constituant	Concentration	Laboratoire
DEET 50	spray	DEET	50%	SMI
INSECT ECRAN	Lotion Gel	DEET	50%	Osler
REPEL INSECT	Spray	DEET	50%	Cattier Dislab
MOSKIZ OL	Gel	DEET	50%	MOSKIZ OL